



CISCARE®

Complemento alimenticio a base de extracto seco de Gayuba 400mg
para el BIENESTAR URINARIO

QUÉ ES CISCARE® Y PARA QUÉ SE UTILIZA

CISCARE® contiene 400 mg de extracto seco de Gayuba, equivalente a 64 mg - 96 mg de arbutina.

CISCARE® contribuye al bienestar del tracto urinario. *La Gayuba apoya el normal funcionamiento de la vejiga.

QUÉ NECESITA SABER ANTES DE TOMAR CISCARE®

No utilizar CISCARE® en caso de embarazo, lactancia, insuficiencia renal o hepática o en caso de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de sus componentes. No utilizar CISCARE® en niños, menores de 18 años y hombres sin consejo médico previo.

CISCARE® debe tomarse durante 7 días consecutivos, incluso si hay una mejora significativa de los síntomas. Para una eficacia mayor y más rápida, evite la acidificación de la orina e ingiera elevadas cantidades de agua. Puede causar náuseas, vómitos o molestias gástricas.

Fabricado por :

TIILMAN SA

Z.I. Sud 15

B-5377 Baillonville (Bélgica)

CÓMO CONSERVAR CISCARE®

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Conservar por debajo de 25°C.

MODO DE EMPLEO

Tomar CISCARE® con agua, preferiblemente después de las comidas, durante 7 días consecutivos.

+18 años (2 comprimidos 3 veces al día).

INGREDIENTES POR COMPRIMIDO:

Extracto seco de hojas de Gayuba *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. 400 mg (equivalente a 64 mg - 96 mg de arbutina);

Espesante: celulosa microcristalina; Almidón; Antiglomerantes: talco, sales de magnesio de ácidos grasos; Agentes de recubrimiento: carbonato cálcico, isomalt, hidroxipropilmetylcelulosa, triglicéridos de cadena media.

O QUE É CISCARE® E PARA QUE É UTILIZADO

CISCARE® contém 400 mg de extrato seco de Uva-ursina, equivalente a 64 mg- 96 mg de arbutina.

CISCARE® contribui para o bem-estar do sistema urinário. *A Uva-ursina suporta o normal funcionamento da bexiga.

O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR CISCARE®

Não utilizar CISCARE® em caso de gravidez, amamentação, insuficiência renal ou hepática, ou em caso de hipersensibilidade ou alergia a algum dos seus componentes. Não utilizar CISCARE® em crianças menores de 18 anos e em homens, sem indicação médica prévia.

CISCARE® deve ser tomado durante 7 dias consecutivos, mesmo que haja melhoria significativa dos sintomas. Para uma maior e mais rápida eficácia, evite a acidificação da urina e ingira elevadas quantidades de água. Pode originar náuseas, vómitos ou desconforto gástrico.

COMO CONSERVAR CISCARE®

Conservar ao abrigo da luz, calor e humidade. Manter abaixo de 25°C.

COMO TOMAR CISCARE®

CISCARE® deve ser tomado com água, preferencialmente após as refeições. Tomar durante 7 dias consecutivos.

+18 anos (2 comprimidos 3 vezes por dia).

INGREDIENTES POR COMPRIMIDO:

Extracto seco de folhas de Uva-ursina *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. 400 mg (equivalente a 64 mg - 96 mg de arbutina); Agente de volume: celulose microcristalina; Amido; Antiglomerantes: talco, sais de magnésio de ácidos gordos; Agentes de revestimento: carbonato de cálcio, isomalte, hidroxipropilmetylcelulose, triglicerídeos de cadeia média.



PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Avda. Miguel Hernández 21, Bajo
46450 Benifaió (Valencia)- España



Distribuidor em Portugal:
PCHP - WOMEN CARE UNIP. LDA.
Lagoas Park, Edifício 7, Piso 1 Sul
2740-244 Porto Salvo - Portugal